

Evento: COBRA F

Modalidade: ORAL

Tema: C05. Fisioterapia na Saúde e Funcionalidade do Adulto

REPRODUTIBILIDADE DO QUESTIONÁRIO ABILOCO-BRASIL EM INDIVÍDUOS PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO: UM ESTUDO METODOLÓGICO

PATRICK ROBERTO AVELINO - UFMG - patrickpk4@yahoo.com.br, Kênia Kiefer Parreira de Menezes - UFMG, Iza de Faria-Fortini - UFMG, Marluce Lopes Basílio - UFMG, Lucas Rodrigues Nascimento - UFMG, Luci Fuscaldi Teixeira-Salmela - UFMG

Introdução: Após um Acidente Vascular Encefálico (AVE), a locomoção é umas das tarefas cotidianas mais afetadas, reportadas pelos pacientes. O ABILOCO é um questionário autorrelatado, específico para indivíduos pós-AVE, para a avaliação da habilidade de locomoção. No entanto, sua reprodutibilidade ainda não foi investigada. **Objetivos:** Avaliar a reprodutibilidade, ou seja, a confiabilidade teste-re-teste e a variabilidade das medidas do ABILOCO-Brasil em indivíduos pós-AVE crônicos. **Métodos:** Trata-se de um estudo metodológico. Para avaliar a confiabilidade teste-reteste, o ABILOCO-Brasil foi aplicado duas vezes em duas ocasiões, com cinco a sete dias de intervalo, pelo mesmo avaliador, em condições similares. O Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) foi calculado para análise. Para avaliar a variabilidade, foram calculados o erro padrão de medida (EPM) e a mudança mínima detectável (MMD). Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal de Minas Gerais (CAAE 06609312.0.0000.5149). **Resultados:** Trinta e um indivíduos com hemiparesia pós-AVE, sendo 21 homens, com idade média de 60 (SD 10) anos, foram avaliados. Os gráficos de Bland & Altman detectaram dois valores atípicos (outliers). Os valores de ICC foram de 0.76 e 0.90 com e sem outliers, respectivamente. Quando os outliers foram removidos, o valor EPM (EPM%) foi de 0,35 (14%). Os resultados da MMD indicaram que, para mudanças reais serem detectadas, os escores do ABILOCO-Brasil devem mudar pelo menos 0.97 logits. **Conclusão:** O ABILOCO-Brasil mostrou ser confiável para ser aplicado em contextos clínicos e de pesquisa para a avaliação da habilidade de locomoção de indivíduos com AVE crônico, com adequados valores de confiabilidade teste-reteste e EPM. Além disso, somente mudanças com valor acima da MMD encontrada podem ser consideradas alterações reais na condição clínica dos indivíduos.