

**Evento:** COBRA F

**Modalidade:** PÔSTER

**Tema:** C05. Fisioterapia na Saúde e Funcionalidade do Adulto

## **Avaliação por questionário abrange as perspectivas auto relatadas pelos pacientes com dor lombar crônica?**

CALISTENE VIEIRA TELES (TELES, C. V.) - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - calisvt@gmail.com, Renata Grasiela Lopes de Jesus (JESUS, R. G. L.) - Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de Sergipe, São Cristovão/SE, Brasil., Heliadja da Silva Lima (LIMA, H. S.) - Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de Sergipe, São Cristovão/SE, Brasil., Luana Caroline Dantas Pereira (PEREIRA, L. C. D.) - Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Universidade Federal de Sergipe, São Cristovão/SE, Brasil., Ariani Nara Santos Andrade (ANDRADE, A. N. S.) - Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de Sergipe, São Cristovão/SE, Brasil., Ana Verena Alves Calmon Almeida (ALMEIDA, A. V. A. C.) - Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de Sergipe, São Cristovão/SE, Brasil., Gessica Uruga Oliveira (OLIVEIRA, G. U.) - Programa de Doutorado em Ciências da Saúde, Universidade Federal de Sergipe, São Cristovão/SE, Brasil., Jader Pereira de Farias Neto (FARIAS NETO, J. P.) - Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de Sergipe, São Cristovão/SE, Brasil.

**Introdução:** O termo lombalgia refere-se a dor localizada abaixo da margem das últimas costelas e acima das linhas glúteas inferiores. Pode atingir até 65% das pessoas do mundo, sendo que até 84% das pessoas em algum momento da vida apresentam esse tipo de dor, gerando tanto impactos nos serviços de saúde quanto na funcionalidade desses pacientes. Nesse contexto, a Organização Mundial de Saúde em 2001 lançou a Classificação Internacional da Funcionalidade Incapacidade e Saúde (CIF), uma classificação pautada no modelo biopsicossocial. Através dessa, deu-se o reconhecimento de que função e saúde são resultados da interação de uma complexa rede de componentes. Entretanto, mesmo com a preocupação da influência do meio sobre a funcionalidade, pouco se fala sobre a perspectiva do paciente sobre a essa condição de saúde. **Objetivos:** Observar se a avaliação funcional realizada pelos profissionais de saúde, através dos questionários recomendados pela literatura científica, atende a perspectiva do paciente identificada através do grupo focal. Outrossim, objetivou identificar os códigos da CIF presentes nos grupos focais e nos questionários utilizados. **Métodos:** Trata-se de um estudo qualitativo, aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Sergipe (sob número 2.397.623), realizado de ago/2017 a dez/2017. Participaram da pesquisa, sujeitos de ambos os sexos recrutados no ambulatório de fisioterapia da Universidade Federal de Sergipe, que tivessem encaminhamento com diagnóstico clínico de Lombalgia. Foram realizados grupos focais com os pacientes para identificação da perspectiva dos mesmos, sendo obtidas unidades de significado após a análise de conteúdo. Tais grupos foram conduzidos por um moderador e um segundo investigador, previamente treinados, que fez a gravação das discussões e transcrições. Em seguida, as unidades de significado foram associadas aos códigos da CIF para que

pudessem ser comparadas aos códigos identificados nos questionários. Foram utilizados os questionários Rolland Morris Disability (RMDQ) e Fear Avoidance Beliefs (FABQ), padrões ouro para avaliação funcional da dor lombar. Resultados: No total, participaram 27 pacientes, sendo 19 mulheres e 8 homens, com idade média de 55,24 anos. Em relação aos questionários, apenas 16% dos itens presentes no grupo focal foram correlacionados, sendo a maioria pertencente ao capítulo de atividade e participação da CIF. O questionário RMDQ apresentou 6 códigos da CIF não identificados pelo grupo focal e o questionário FABQ apresentou 2 códigos da CIF não identificados. Conclusão: Os questionários utilizados para a avaliação funcional do paciente com lombalgia conseguem atender parcialmente a perspectiva dos pacientes. Descritores: Atividades cotidianas; Grupos Focais; CIF.